

Link do produktu: <https://www.swiat4lap.pl/rodicare-appetit-15-ml-pobudzanie-apetytu-na-apetyt-p-4868.html>



## RodiCare Appetit 15 ml - pobudzanie apetytu (na apetyt)

Cena	<b>59,00 zł</b>
Cena poprzednia	<b>82,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod EAN	<b>4260215712013</b>
PKWiU	<b>10.92.10.0</b>
Producent	<b>Alfavet</b>

### Opis produktu

#### RodiCare® Appetit 15 ml

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla królików, świnek oraz małych gryzoni do pobudzania apetytu.

Informacje:

Brak apetytu u świnek morskich, królików i małych gryzoni musi być zawsze traktowany bardzo poważnie. Ze względu na szybki metabolizm, dochodzi do gwałtownej utraty energii, co może mieć negatywny wpływ na stan wątroby. Ponadto u królików i świnek morskich już kilka godzin nieprzyjmowania pokarmu prowadzi do niestrawności, z potencjalnie poważnymi konsekwencjami. Z tego powodu zwierzęta, które nie jedzą, zawsze powinny być pokazane lekarzowi weterynarii w celu ustalenia przyczyny braku apetytu.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

RodiCare Appetit uzupełnia ubogie w zioła pożywienie w korzeń tataraku, imbir oraz smakowite aromatyczne składniki (ekstrakt z goryczki, ekstrakt z piołunu, ekstrakt z owoców pieprzowca) i w ten sposób stymuluje apetyt.

Skład:

Cukier dekstroza 10%

Korzeń tataraku 2%

Korzeń imbiru 0,5%

Składniki analityczne:

Białko surowe 0%

Włókno surowe 0,4%

Oleje i tłuszcze surowe 0%

Popiół surowy 0,5%

Sód 0,1%

---

Wilgotność 80,5%

Dodatki na 1000ml:

Ekstrakt z goryczki 25 ml

Ekstrakt z piołunu 20 ml

Ekstrakt z korzenia imbiru 15 ml

Ekstrakt z owoców pieprzowca 0,4 ml

Ekstrakt ze Stewii 0,5 ml

Masa netto 15 ml

Postać handlowa:

Buleteczka 15 ml ze strzykawką

Sposób podawania:

Podawać wymieszane z pokarmem lub bezpośrednio do pyszczka:

Myszy, Chomiki:

1 - 3 x dziennie po 0,05 ml

Szczury:

1 - 3 x dziennie po 0,1 ml

Świnki morskie, Króliki miniaturowe:

1 - 3 x dziennie po 0,2 - 0,3 ml

Króliki:

1 - 3 x dziennie po 0,4 - 0,6 ml

Zalecany okres podawania: 2-5 dni

Uwagi:

Zwierzę powinno mieć stały dostęp do świeżej wody!

Wstrząsnąć przed użyciem.

Po użyciu umyć strzykawkę

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.