

Link do produktu: <https://www.swiat4lap.pl/rodicare-hairball-100-ml-usuwanie-zlogow-przewodu-pokarmowego-nowe-opakowanie-p-4879.html>



RodiCare Hairball 100 ml - usuwanie złożeń przewodu pokarmowego (Nowe opakowanie)

Cena	79,00 zł
Cena poprzednia	152,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	4260215712747
PKWiU	10.92.10.0
Producent	Alfabet

Opis produktu

RodiCare® Hairball 100 ml

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla królików i świnek morskich, wspomagająca eliminację złożeń włosowych i bezoarów z przewodu pokarmowego. Z laktulozą, łuskami psyllium i koncentratem z ananasa. Bez dodatku cukru i zbóż.

Informacje:

Pożnięte przez zwierzę włosy czasem mają problem z przejściem przez przewód pokarmowy i odkładają się w żołądku lub jelitach w postaci bezoarów. Może to objawiać się pojawieniem łańcuszkowo połączonych bobków, ale również doprowadzić do zaparć, a nawet groźnej dla życia niedrożności przewodu pokarmowego.

Łuski nasion psyllium (babki płesznik) zawierają substancje śluzowe, które są w stanie związać dużą ilość wody. Uwodnione łuski nasion otaczają złoże, umożliwiając ich usunięcie. Koper, rumianek i mięta mają działanie łagodzące na podrażnione jelita.

Dodatkowo preparat zawiera laktulozę. Nie zawiera cukru ani zbóż.

Skład:

laktuloza 9,7%, koncentrat z ananasa, oleje roślinne, rafinowane (olej lniany, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej sojowy), łuski psyllium (babki płesznik) 1,9%, drożdże, [mięta suszona, suszone kwiaty rumianku, glistnik, koper włoski, jeżyna suszona, korzeń goryczki suszony, korzeń rabarbaru] zmacerowane po 0,2 %, [mięta, suszone kwiaty rumianku, glistnik, koper włoski, jeżyna suszona, korzeń goryczki suszony, korzeń rabarbaru] zmielone po 0,01%

Składniki analityczne:

białko surowe 1,4%, włókno surowe 0 %, oleje i tłuszcze surowe 7,1%, popiół surowy 0,7%, wilgotność 79,2%,

Dodatki:

Aromaty: wyciąg z ostropestu plamistego 3ml, [wyciąg z karczocha, wyciąg z korzenia lukrecji, wyciąg z kurkumy] po 2 ml

Sposób podawania:

świnki morskie

2x dziennie 1 ml przez 5 dni

Króliki:

2x dziennie 1-2 ml przez 5 dni

Zapobiegawczo:

2-3 dni w tygodniu lub 1 x dziennie

W razie potrzeby dawkę można podwoić lub powtórzyć po konsultacji z lekarzem weterynarii. Możliwe jest długotrwałe podawanie.

Uwaga! Przekroczenie zalecanej dawki może spowodować biegunkę.

Zużyć w ciągu 6 tyg. od otwarcia. Przechowywać w temp. poniżej 25 stopni C

Uwagi dotyczące podawania preparatu:

Preparat może być podawany na pokarm, lub za pomocą dołączonej strzykawki. Aby napełnić strzykawkę, należy wyciągnąć tłoczek i napełnić ją od tyłu. Jedno naciśnięcie pompki odpowiada ok 1 ml preparatu. W żadnym wypadku nie można podawać preparatu zwierzęciu leżącemu na plecach, gdyż może to grozić zachłyśnięciem. Jeśli zwierzę nie chce pobrać preparatu dobrowolnie, należy ostrożnie wsunąć zakończenie tubostrzykawki od strony policzka i podawać małymi porcjami, które zwierzę będzie mogło niezależnie połknąć. Nie podawać przy niedrożności jelit. Zwierzę z objawami zaparcia powinno być zawsze zbadane przez lekarza weterynarii, gdyż zaburzenia przewodów pokarmowych mogą mieć poważne konsekwencje.