

Link do produktu: <https://www.swiat4lap.pl/rodicare-hairball-12-ml-1-tubostrzykawka-usuwanie-zlogow-przewodu-pokarmowego-p-4869.html>



RodiCare Hairball 12 ml - 1 tubostrzykawka - usuwanie złożeń przewodu pokarmowego

Cena	37,97 zł
Cena poprzednia	52,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	4260215712303
PKWiU	10.92.10.0
Producent	Alfavet

Opis produktu

RodiCare® Hairball - tubostrzykawka 12 ml

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla królików i świnek morskich, wspomagająca eliminację złożeń włosowych i bezoarów z przewodu pokarmowego. Z laktulozą, łuskami psyllium i koncentratem z ananasa. Bez dodatku cukru i zbóż.

Informacje:

Pożnięte przez zwierzę włosy czasem mają problem z przejściem przez przewód pokarmowy i odkładają się w żołądku lub jelitach w postaci bezoarów. Może to objawiać się pojawieniem łańcuszkowo połączonych bobków, ale również doprowadzić do zaparć, a nawet groźnej dla życia niedrożności przewodu pokarmowego.

Łuski nasion psyllium (babki płesznik) zawierają substancje śluzowe, które są w stanie związać dużą ilość wody. Uwodnione łuski nasion otaczają złoże, umożliwiając ich usunięcie. Koper, rumianek i mięta mają działanie łagodzące na podrażnione jelita.

Dodatkowo preparat zawiera laktulozę. Nie zawiera cukru ani zbóż.

Skład:

laktuloza 9,7%, koncentrat z ananasa, oleje roślinne, rafinowane (olej lniany, olej rzepakowy, olej słonecznikowy, olej sojowy), łuski psyllium (babki płesznik) 1,9%, drożdże, [mięta suszona, suszone kwiaty rumianku, glistnik, koper włoski, jeżyna suszona, korzeń goryczki suszony, korzeń rabarbaru] zmacerowane po 0,2 %, [mięta, suszone kwiaty rumianku, glistnik, koper włoski, jeżyna suszona, korzeń goryczki suszony, korzeń rabarbaru] zmielone po 0,01%

Składniki analityczne:

białko surowe 1,4%, włókno surowe 0 %, oleje i tłuszcze surowe 7,1%, popiół surowy 0,7%, wilgotność 79,2%,

Dodatki:

Aromaty: wyciąg z ostropestu plamistego 3ml, [wyciąg z karczocha, wyciąg z korzenia lukrecji, wyciąg z kurkumy] po 2 ml

Sposób podawania:

świnki morskie 2x dziennie 1 ml przez 5 dni

Króliki 2x dziennie 1-2 ml przez 5 dni

Zapobiegawczo: 2-3 dni w tygodniu lub 1 x dziennie

W razie potrzeby dawkę można podwoić lub powtórzyć po konsultacji z lekarzem weterynarii. Możliwe jest długotrwałe podawanie.

Uwaga! Przekroczenie zalecanej dawki może spowodować biegunkę.

Zużyć w ciągu 6 tyg od otwarcia. Przechowywać w temp. poniżej 25 stopni C.

Uwagi dotyczące podawania preparatu:

Preparat znajduje się w specjalnej tubostrzykawce. Regulowany pierścień zapobiega podaniu zbyt dużej ilości preparatu. Przed każdym podaniem należy nastawić pierścień ograniczający na odpowiednią dawkę wyznaczając ją od lewej krawędzi pierścienia. Każda kreska na skali odpowiada 0,5 ml preparatu.

W żadnym wypadku nie można podawać preparatu zwierzęciu leżącemu na plecach, gdyż może to grozić zachłyśnięciem. Jeśli zwierzę nie chce pobrać preparatu dobrowolnie, należy ostrożnie wsunąć zakończenie tubostrzykawki od strony policzka i podawać małymi porcjami, które zwierzę będzie mogło niezależnie połknąć. Nie podawać przy niedrożności jelit. Zwierzę z objawami zaparcia powinno być zawsze zbadane przez lekarza weterynarii, gdyż zaburzenia przewodu pokarmowego mogą mieć poważne konsekwencje.